
LIBROS Y PUBLICACIONES

AUTOEVALUACION DE CONOCIMIENTOS EN PSIQUIATRIA INFANTIL

G. PIROOZ SHOLEVAR M.D.

Director del CHILD IMPATIENT SERVICE
Hahneman Medical College and Hospital de Philadelphia.

Dada la gran acogida que entre los lectores de esta Revista han tenido las preguntas que publicamos en nuestro pasado número, extraídas del interesante libro AUTOEVALUACION DE CONOCIMIENTOS EN PSIQUIATRIA INFANTIL del Dr. G. PIROOZ SHOLEVAR, hemos creído conveniente publicar algunas más que dan una idea más exacta de lo que este libro es y representa.

**SELF ASSESMENT OF CURRENT
KNOWLEDGE IN CHILD
PSYCHIATRY**
por: G. PIROOZ SHOLEVAR, M.D.
EDITORIAL:
**MEDICAL EXAMINATION
PUBLISHING COMPANY INC.**

1. Perfil de un niño con fracaso no orgánico, presupone:

- a.- Embarazo no deseado
- b.- Alimento de botella e inadecuadamente inmunizado
- c.- El más pequeño de la familia, nacido dentro los 18 meses de conjunto hijos.
- d.- Fracaso en desarrollo antes de los 2 años de edad.
- e.- Todo esto

2. Niños adoptivos:

- a.- No son remarcables en términos de incidencia de problemas emocionales
- b.- Aparece en mayores proporciones en clínicas de salud mental y facilidades psiquiátricas
- c.- Elevada incidencia de MBD
- d.- Tiende a presentar un QI inferior a los niños no-adoptados
- e.- Nada de todo esto

3. Una aceptable definición de fobia escolar:

- a.- Atención escolar deficiente
- b.- Injustificable temor a la escuela
- c.- Inapropiada ansiedad a abandonar el hogar
- d.- Todo esto
- e.- Nada de esto

4. Ajustamiento psicológico pobre y ansiedad en niños con enfermedades cardíacas congénitas:

- a.- Basado sobre la realización por el niño del aspecto amenazante de su enfermedad
- b.- Relacionado con la angustia materna y engorde
- c.- Grado de incapacidad
- d.- Gravedad de la enfermedad
- e.- Nada de todo esto

5. Los padres de niños con severas enfermedades cardíacas cianóticas congénitas, generalmente presentan:

- a.- Dolor anticipado ante la posible pérdida del niño.
- b.- Negación de posibilidad de pérdida
- c.- problemas conyugales
- d.- Excesiva dependencia nutritiva
- e.- Nada de todo esto

6. Incidencia de adicción a heroína y embarazos en teen-agers, tiene:

- a.- Incremento
- b.- Decrecido
- c.- No descrito
- d.- La adicción a la heroína se ha elevado, los embarazos han disminuido

7. La heroína atraviesa la barrera placentaria en:

- a.- 30 minutos de haber sido tomada por la madre
- b.- 1 hora de haber sido tomada por la madre
- c.- 2 ó 3 horas después de haber sido tomada por la madre
- d.- 3 ó 6 horas después de haber sido tomada por la madre

8. La gravedad de acúmulo de heroína en el recién nacido se relaciona con:

- a.- Número de años de la adicción de la madre
- b.- Promedio de cantidad total ingerida por la madre en un periodo de 6 meses
- c.- Cantidad de la última dosis tomada por la madre
- d.- No relación
- e.- Nada de todo esto.

9. La reciente teoría de como las drogas estimulantes operarían en niño hiperquinéticos:

- a.- Paradójica
- b.- Sedativa
- c.- Mejora los mecanismos adrenérgicos centrales
- d.- Mejora los mecanismos parasimpáticos
- e.- Nada de todo esto

10. Los niños con reacciones típicas de conversión:

- a.- Manifiesta "La Belle Indifference"
- b.- Raramente manifiestan "La Belle Indifference"
- c.- Tienen un QI inferior
- d.- Son excesivamente independientes.

11. Un importante aspecto en el tratamiento de los niños con severas lesiones de nacimiento:

- a.- Nurse, grupo de niños
- b.- Madre, grupo de niños
- c.- Físicos, grupo de niños
- d.- Voluntario, grupo de niños

12. Un mayor factor en el presente, los problemas de la adolescencia:

- a.- Pubertad precoz
- b.- Actitudes libres frente a la sexualidad
- c.- Escasa necesidad de enfrentarse a la realidad
- d.- Super realización
- e.- Infra realización

13. Signos premonitorios de agresión homicida en jóvenes:

- a.- Profundo pesimismo acerca de sí
- b.- Odio a sí mismo
- c.- "Pide ayuda"
- d.- Todo esto
- e.- Nada de esto

14. La depresión de los niños frente a la muerte de un adulto importante es:

- a.- Inmediata y obvia
- b.- Indiferencia inicial, puede aparecer el luto después
- c.- Semejante a la de los adultos
- d.- Nada de todo esto

15. Hospitalización en anorexia nerviosa, en los niños:

- a.- Breve
- b.- Largo tiempo
- c.- No aconsejable
- d.- Nada de todo esto

16. Donald B. Rinsley ha sugerido que, cuando existe una psicopatología significativa en un adolescente o pre-adolescente es debido a:

- a.- Fracaso en la formación del superego
- b.- Despersonificación
- c.- Niño maltratado
- d.- Ausencia de padre o padre inafectivo
- e.- Nada de todo esto

17. Fish relata que los niños con severos trastornos de conducta y niños esquizofrénicos:

- a.- Responden bien a la detroanfetamina
- b.- Responde pobremente a la difenilhidramina
- c.- Responde bien al Ritaline
- d.- Todo esto
- e.- Nada de todo esto

18. Fish relata que los niños con "sobre-ansiedad" y "reacción agresiva insocializada":

- a.- Responde bien a la detroanfetamina
- b.- Responden pobremente a la difenilhidramina
- c.- Responde bien al Ritaline
- d.- Todo esto
- e.- Nada de todo esto

19. Un mayor efecto de la prolongada ingestión de fenotiazina en psicóticos y niños hospitalizados:

- a.- Cambio de peso
- b.- Disquinesia tardía
- c.- Aprendizaje lesionado
- d.- Cambios oculares
- e.- Todo esto

20. La tioridazina en un prolongado período de administración en niños resulta:

- a.- Pérdida de peso
- b.- Aumento de peso
- c.- Pérdida de apetito
- d.- Nada de todo esto

21. Rutter y Bartak definen el primer handicap del autismo como:

- a.- Superego defectuoso
- b.- Defecto cognitivo básico
- c.- Regresión madurativa
- d.- "Persona sistema"
- e.- Nada de todo esto

22. Los "trastornos psicóticos esquizofrénicos"

- a.- No evidencia de psicosis durante los primeros 5-6 años de vida
- b.- No mecanismos de defensa neuróticos, regresión negativa y proyección
- c.- Descompensación latente
- d.- Buen pronóstico
- e.- Todo esto

23. El examen del cariotipo de niños de madres que tomaban LSD, muestra:

- a.- Evidencia de "rotura" de cromosomas
- b.- No evidencia de rotura de cromosomas
- c.- Elevada frecuencia de anomalías clínicas
- d.- Nada de todo esto

24. Mayor y menores signos neurológicos vistos en el nacimiento y en el primer año de vida:

- a.- Asociado con deficiente aprendizaje y pobreza escolar en la edad de 7 años
- b.- No pronosticar problemas escolares a los 7 años
- c.- No tiene valor
- d.- Nada de todo esto

25. "Alexia"

- a.- Trastorno del lenguaje
- b.- Trastorno de lectura
- c.- Trastorno auditivo
- d.- Trastorno motriz

26. La dislexia en una población normal en edad escolar.

- a.- 0-5%
- b.- 5-10%
- c.- 10-30%
- d.- 40%
- e.- 50%

27. Percepción del lenguaje hablado

- a.- Cortex occipital
- b.- Lóbulo temporal
- c.- Hemisferio cerebral izquierdo
- d.- desconocido

28. Lesiones del sistema nervioso central más frecuentes en el nacimiento:

- a.- Debidos a procesos prenatales
- b.- Resultado de partos difíciles
- c.- Debido a medicaciones utilizadas durante el parto
- d.- debido a anoxia

29. Síndrome del "cabello ensortijado"

- a.- Enfermedad neurodegenerativa que solo afecta a los niños
- b.- cabello poco común
- c.- Retraso psicomotriz, fracaso del crecimiento
- d.- atrofia cerebelosa
- e.- Todo esto

30. El síntoma más constante en el retinismo

- a.- Constipación
- b.- Problemas alimenticios
- c.- Apatía
- d.- Todo esto
- e.- Nada de todo esto

31. Algunos estudios sobre las situaciones de urgencia psiquiátrica sugieren:

- a.- Existen verdaderas crisis
- b.- No hay verdaderas urgencias concernientes al niño, sino a los demás.
- c.- Grave necesidad de servicios de urgencia
- d.- Nada de todo esto

32. Valoración de la educación parental:

- a.- No hay cambio en las actitudes paternas
- b.- No hay cambio en la actitud de los niños
- c.- No aumenta la comunicación familiar
- d.- Todo esto
- e.- Nada de todo esto

33. Estudios extensivos de ("wrist cutting") incisión de venas de la muñeca - revela:

- a.- La mayoría son mujeres
- b.- Los hombres representan el 40% de esta población
- c.- Suelen estar casados
- d.- Elevada incidencia de intentos de suicidio previos
- e.- Nada de todo esto

34. Cortes de muñeca e ingestión de aspirina:

- a.- Peculiar a la adolescencia
- b.- Visto en grupos de todas las edades
- c.- Está desaparecido
- d.- Nada de todo esto

35. Potencial suicida:

- a.- Mediana edad
- b.- Matrimonios fracasados
- c.- Elevado cortisol plasma
- d.- Bajo nivel corticoesteroide

36. Comunicaciones suicidas:

- a.- Síntomas comunes en adolescentes hospitalizados
- b.- Aumento después de los 14 años de edad
- c.- No asociado con ningún trastorno psiquiátrico definido
- d.- Todo esto

37. Frecuencia segerida de uso de drogas por estudiantes de escuela superior:

- a.- 10%
- b.- 24%
- c.- 36%
- d.- 40%

38. La causa más común de admisiones hospitalarias por uso excesivo de drogas en niños es:

- a.- Aspirina
- b.- Antidepresivos tricíclicos
- c.- Envenamamiento derivado
- d.- Nada de todo esto

39. Relación entre el autismo y la esquizofrenia:

- a.- Ninguna
- b.- El autismo es la manifestación precoz de la esquizofrenia
- c.- Estadísticas no válidas
- d.- Nada de todo esto

40. Rutter reconoce los trazados neuróticos de la infancia:

- a.- Directamente relacionados con la neurosis adulta
- b.- No existe una relación directa
- c.- No es una neurosis
- d.- Nada de todo esto

41. Transexualismo masculino en la infancia:

- a.- Penetrante identificación con la femineidad de la madre
- b.- Penetrante identificación con la masculinidad del padre
- c.- Relaciones simbióticas
- d.- Nada de todo esto

42. Observación de recién nacidos de Wolff:

- a.- No hay límites definidos en las primeras 4 semanas
- b.- Determinados niños tienen una específica ritmicidad del SNC
- c.- Diferencias en los sucesos reactivos
- d.- Nada de todo esto

43. Lipton estudio las respuestas autonómicas de los recién nacidos:

- a.- Diferencias de niños específicos
- b.- Sucesos reactivos
- c.- Ritmicidad específica
- d.- Nada de todo esto

RESPUESTAS CORRECTAS:

1.- e					
2.- g	9.- c	16.- b	23.- d	30.- a	37.- b
3.- d	10.- a	17.- e	24.- a	31.- b	38.- b
4.- b	11.- a	18.- a	25.- b	32.- d	39.- a
5.- a	12.- c	19.- e	26.- c	33.- b	40.- c
6.- a	13.- d	20.- b	27.- c	34.- a	41.- a
7.- b	14.- b	21.- b	28.- e	35.- c	42.- b
8.- c	15.- a	22.- e	29.- d	36.- d	43.- a

